



## Gå igenom dina mediciner inför operation

**Om du tar mediciner är det viktigt att du läser igenom detta avsnitt noggrant.**

### • **Blodförtunnande medicin**

Du behöver få särskilda instruktioner av din ordinarie eller opererande läkare om när medicineringen skall pausas inför operationen. Vid oklarheter är det viktigt att du hör av dig till oss.

### • **Diabetes**

Ta inte Metformin operationsdagens morgon.

Ta inte ta dina anti-diabetestabletter på operationsdagens morgon.

Ta inte insulin på operationsdagens morgon innan du kommer till oss.

Vi kontrollerar ditt blodsocker. Ta med din egna blodsockermätare och ditt insulin.

Om du har insulinpump ska den vara på.

### • **Blodtrycks medicin**

Ta inte: Enalapril, Captopril, Triatec m.fl. på operationsdagens morgon. (ACE hämmare)

Losartan, Candesartan, Atacand m.fl. på operationsdagens morgon (Angiotensin 2 hämmare)

Du ska ta övriga blodtrycksmediciner på operationsdagens morgon

Betablockerare: Exempel på dessa är Seloken, Atenolol, Metoprolol m.fl.

Kalciumflödeshämmare: Felodipin, Plendil, Amlodipin, Norvasc, Isoptin m.fl.

Vanligen ringer vår narkosläkare upp inför operation för att säkerställa att du har rätt information om medicineringen.

### • **Vätskedrivande medicin**



Ta inte Furix, Lasix, Spironolakton, Esidrex eller likande på operationsdagens morgon.

- **Smärtstillande**

Om du behandlas med smärtstillande läkemedel ska du fortsätta ta dessa utan uppehåll om inte din läkare ger andra instruktioner. Meddela oss

- **Naturläkemedel**

Tar du naturläkemedel t.ex. Omega 3, behöver göra ett uppehåll 14 dagar innan din operation. Är operationen inom 14 dagar sluta så fort som möjligt.

- **Astma**

Du ska ta dina astma mediciner som vanligt på operationsdagens morgon.

Ta med dina astma mediciner till operation.

- **Allergimedecin**

Du ska ta dina läkemedel, med lite vatten, som vanligt på operationsdagens morgon.